



SALUD

INFORME

ALTA MIOPIA

Revisiones y prevención



Respecto a la diabetes, la afectación de los vasos sanguíneos del ojo hace que los problemas visuales sean habituales entre los diabéticos. / EFE

En España se registra un total de 30.000 casos anuales de desprendimiento de retina, según datos de la *Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV)*: una patología grave que en caso de no ser tratada con prontitud, derivará en la pérdida total de la visión. El desprendimiento de retina se produce por la separación espontánea de las capas interna (retina neurosensorial) y externa (epitelio pigmentario) de la retina. Se acumula líquido en el espacio que se forma entre ambas

capas, y la retina desprendida no puede funcionar ni nutrirse de forma adecuada.

Ante la gravedad de esta patología, el profesor José María Ruiz Moreno, director médico del *Instituto Europeo de la Retina Baviera (IER Baviera)*, señala la prevención como principal herramienta y recomienda la realización de revisiones periódicas, especialmente en el caso de pertenecer a alguno de los principales grupos de riesgo: miopes, diabéticos, personas

Están en riesgo miopes, diabéticos y personas con antecedentes familiares

con antecedentes familiares de desprendimiento y que hayan sufrido complicaciones en cirugías oculares previas o traumatismos oculares.

Por su parte, respecto a la diabetes, añade que «la afectación de los vasos sanguíneos del ojo, hace que los problemas visuales sean habituales entre los diabéticos. El desprendimiento de retina, puede ser una de las complicaciones más graves en los pacientes que sufren diabetes».

/ DP/